



RizoFlow Boro N é um fertilizante mineral misto foliar à base de boro MEA, desenvolvido para proporcionar alta eficiência na absorção e translocação do nutriente. Sua formulação melhora o desenvolvimento reprodutivo, favorece a floração e a frutificação, além de contribuir para o equilíbrio nutricional das plantas.

Foliar | Fluido



Vantagens/Benefícios

- Favorece a floração, fecundação e frutificação;
- Aumenta a translocação de carboidratos;
- Melhora a qualidade dos frutos;
- Maior rentabilidade ao produtor.



Garantias

- Nitrogênio (N): 1,0%;
- Boro (B): 10,0%;

*Nutrientes solúveis em água.



Dosagem e Aplicação

- **Algodão:** 1,0 L/ha. Aplicar 3 a 4 vezes. Iniciar antes do florescimento e repetir com intervalo de 7 a 15 dias;





- **Alho e Cebola:** 1,2 L/ha. Aplicar 3 vezes. Iniciar 15 a 20 dias após a emergência e repetir com intervalos de 15 a 20 dias;
- **Arroz, Milho e Trigo:** 1,5 L/ha. Aplicar 2 vezes, uma antes e outra após o florescimento;
- **Batata:** 0,6 L/ha. Aplicar 3 vezes. Iniciar 20 dias após a emergência e repetir com intervalos de 10 dias;
- **Café e Cacau:** 1,5 L/ha. Aplicar 3 a 4 vezes. Iniciar antes do florescimento e repetir com intervalos de 30 a 45 dias;
- **Cana-de-açúcar:** 2,0 L/ha. Aplicar 2 vezes. Iniciar 25 a 30 dias após a brotação e repetir 45 a 60 dias depois;
- **Citros:** 1,0 L/ha. Aplicar 3 a 4 vezes ao ano. Iniciar antes do florescimento e repetir em intervalos de 45 a 60 dias;
- **Flores e Plantas ornamentais:** 0,3 L/ha. Aplicar 4 vezes por ciclo. Iniciar com a brotação nova ou após o corte, e repetir com intervalos de 15 dias;
- **Frutíferas em geral:** 1,0 L/ha. Aplicar 3 a 4 vezes. Iniciar antes do florescimento e repetir em intervalos de 45 a 60 dias;
- **Maçã, Pera e Pêssego:** 2,0 L/ha. Aplicar 5 a 9 vezes ao ano. Começar no florescimento e repetir até a colheita com intervalos de 15 dias;
- **Soja, Amendoim e Feijão:** 1,0 L/ha. Aplicar 2 vezes ao ano, uma antes e outra após o florescimento;
- **Tomate, Berinjela e Hortaliças:** 0,3 L/ha. Aplicar quinzenalmente. Iniciar 15 dias após o transplante e repetir a aplicação até a colheita.